

ออกแบบแผนกเภสัชกรรมให้มีห้องจ่ายยา และจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยอย่างเหมาะสม (บริเวณจ่ายยา/ให้คำแนะนำผู้ป่วย/เก็บรักษา/ผสมยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย)

แผนกเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชวิถี

Osetamivir Suspension

ชื่อสูตรยา Osetamivir Suspension 10 mg/ml

วิธีการเตรียม

1. ล้างมือและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
2. สวมหน้ากากอนามัยและถุงมือ: gloves/protection แล้วนำยาไปชั่งน้ำหนัก
3. นำใส่ภาชนะบรรจุที่เตรียมไว้
4. สวมหน้ากากอนามัยและถุงมือตลอดเวลา
5. ล้างมือและนำยาไปชั่งน้ำหนัก

การเก็บรักษา ให้จัดเก็บอุณหภูมิ > 8 องศาเซลเซียส

ความคงตัว 12 เดือน

ข้อมูลเภสัชวิทยา ดูจากเอกสารแนบท้าย

น้ำหนักชาย	ขนาดยา	จำนวนเม็ด	ขนาด
ผู้ใหญ่	75 mg BID	-	-
> 40 kg	75 mg BID	75 mg * 10 tabs	50 ml
25-39 kg	60 mg BID	75 mg * 8 tabs	50 ml
15-24 kg	45 mg BID	75 mg * 6 tabs	40 ml
< 15 kg	30 mg BID	75 mg * 4 tabs	30 ml
อายุ 6-11 เดือน	25 mg BID	75 mg * 3 tabs + 50 mg * 1 tab	20 ml
อายุ 3-5 เดือน	20 mg BID	75 mg * 2 tabs + 45 mg * 1 tab	20 ml
< 3 เดือน	12 mg BID	30 mg * 4 tabs	20 ml

จุดผลิตยา Osetamivir




Pre-Pack

ปี	จำนวนการผลิต
ปี 2566	173 ราย
ปี 2567	140 ราย
ปี 2568	159 ราย




สูตรคำนวณยาจัดและนำเกลือเฉพาะ



ให้คำแนะนำผู้ป่วย